

PRECISAMOS FALAR SOBRE LEPTOSPIROSE



A LEPTOSPIROSE

é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta a urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria *Leptospira*.

A penetração ocorre através da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas.



IMPORTANTE

As enchentes e inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos.

A penetração ocorre através da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas.



Se você teve contato com água ou lama de enchente e apresenta **FEBRE, DOR NO CORPO E DOR DE CABEÇA, PROCURE ATENDIMENTO**



Para **EVITAR A LEPTOSPIROSE** durante inundações, temos **3 PASSOS** para você seguir:

PASSO 01

Limpeza da lama residual

- Use botas e luvas para retirar a lama restante
- Lave o local com solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) a 2,5%



Para 20 litros de água: adicionar 2 xícaras de chá (400ml) de hipoclorito de sódio a 2,5. Aplicar essa solução nos locais contaminados com lama, deixando agir por 15 minutos!

PASSO 02

Limpeza de caixa d'água e cisternas

(Sempre que puder, use botas e luvas)



- Esvaziar a caixa d'água e lavá-la;
- Após a limpeza, colocar 1 litro de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 1.000 litros de água do reservatório;
- Encher a caixa e após 30 minutos, abrir as torneiras da casa por alguns segundos para a água com cloro entrar na tubulação
- Aguardar 1h30 minutos para que ocorra a desinfecção do reservatório e das canalizações;
- Abrir as torneiras, podendo aproveitar a água para limpeza em geral de chão e paredes.





PASSO 03

Caso os alimentos entrem em contato com a água da enchente, **descarte-os** mesmo que estejam em embalagens fechadas





Alimentos enlatados: se as latas estiverem em bom estado, bem fechadas, não amassadas nem enferrujadas – o alimento pode ser consumido.

É importante que as latas sejam bem lavadas antes de abertas





AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Pacientes que tenham sinais e sintomas de **LEPTOSPIROSE** devem iniciar **IMEDIATAMENTE** o uso de antibiótico.

